Agroservet
CATÁLOGO
DE
PRODUCTOS

INDICE

PROMOTOR DE CRECIMIENTO

STROGEN 50 4

ANTIMICROBIANOS

OXITETRACICLINA 5% 6
PANAMICINA LA 20% 7
TILOVET 8
VICARPEN 9
UNIMAST 20 10
MASTIZONE VS 11
SECALAK 12
MASTIZONE LACTACION 13
LACTOMAST 14
MASTIZONE PLUS 15

ANTIHELMINTICOS

BOVIPUR 25% + CO 17
FENLAK 10% 18
EQUIPUR 19
LEVAMISOL 25% 20
PLATELMIN PLUS 21

ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES

PUPPY SHAMPOO 23

CALCIO + REPARACIONES

GLUCONATO DE CALCIO 2 25
NOVAFOS 26
HEMATURINA 27

ECTOPARASITICIDAS

FIPRO TOPSPOT 29
TERMINATOR 30
CYPERMETRIL POUR ON 31
CYPERMETRIL BAÑO 32
SUPOKIL 33
AMITRAZ 34

ENDO-ECTOPARASITICIDAS

IVERMECTAN 36
EQUIMEC 37
PRIMEC 38
VIMEC 1% 39
VIMEC LA 40
VIMEC TOP 3.15% 41

HEMOPARASITICIDAS

IMICAR 43
TRISTEZINA 44

OXITOCICOS

HORMOFISINA 46
PLACENTINA OXITOCINA 47

VITAMINAS Y MINERALES

CACODIL B12 49
SOROVITA COMPLEX 50
PHENODRAL 51
FERREX B12 52
SELOFOS 53

ANTIDIARREICO

CURSOTRAT 55

TERAPEUTICO HORMONAL

VERRUTRAT 57

ANALGESICOS ANTI-INFLAMATORIOS

DIURIDEM 59
FADYNE A4 60

INHIBIDOR DE CELO

ANTICION 62

PRODUCTOS PARA AVES Y CERDOS

PIGLINE 65
PROMOMIX 67
MICOMIX 69
TRISULMIX 71
AVEX 20% 72
CIPROVIC 73

PROMOTOR DE CRECIMIENTO

Agroservet

STROGEN- 50

Boldenona Undecilinato 5 g.
Excipientes C.S.P.

Anabólico de alta concentración para el engorde y desarrollo óseo de bovinos, toretes, novillos o vacas en desecho, equinos y porcinos.

Dosis: 1 ml. por cada 200 libras

Administración: intramuscular profunda

Presentación: 250 y 500 ml

ANTIMICROBIANOS

Agroservet

OXITETRACICLINA 5%

Clorhidrato de oxitetraciclina 5 %
Clorhidrato de Lidocaína 2 %

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro y tratamiento de anaplasmosis. Indicado en todas las especies.

Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y leptospira sp.

Dosis: Preventiva 1 ml por 22 libras
Curativa 3 ml por cada 44 libras

Administración: vía intramuscular profundo por 3 a 4 días.

Presentación: 10, 50, 100, 250, 500 ml

PANAMICINA L.A. 20 %

VICAR
DIVISIÓN VETERINARIA

Oxitetraciclina dihidrato 200 mg.

Antibiótico de amplio espectro, alta concentración, rápido efecto, terapéutico de larga acción.

Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y leptospira sp.

Dosis 1 ml por cada 22 libras,
En aves 0.25 ml por 1 kg de peso vivo, subcutánea

Administración: intramuscular profunda.
En lechones con peso menor a 10 kg, subcutánea

Presentación: 50, 100, 250 y 500 ml.

Agroservet
GUATEMALA

TILOVET

DIVISIÓN VETERINARIA

Tilosina B ase 200.0 mg
Exipiente csp 1.0 ml

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones causadas por: Corynebacterium pyogenes, Pasteurella multocida, Streptococcus spp, Fusobacterium necroprorum, Actinomyces pyogenes, Mycoplasma hyosynoviae, Brachyspira hyodicenteriae, Campylobacter coli, Erysipelothrix rhusiopathiae, Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma mycoides var. Capri.

NO ADMINISTRAR EN EQUINOS

Dosis: Cerdos: 1 ml por cada 10 a 20 KPV diario por 3 días. Bovinos, Ovinos y Caprinos: 1 ml por cada 20 a 40 KPV, diario por 5 días.

Administración: vía intramuscular

Presentación: 50, 100 y 250 ml

Agroservet

VICARPEN

Penicilina Procaina USP 255 000 U.I.
Penicilina Potásica USP 75 000 U.I.
Streptomicina base (como sulfato) 300 gm

Antibiótico indicado en infecciones producidas por microorganismos gram positivos y gram negativos, que provocan infecciones de carácter general o en cavidades como útero o glándula mamaria, de uso en bovinos, equinos, ovinos, porcinos y caninos.

Dosis: 20 ml. por 3 días continuos.

Administración: vía intramuscular profundo

Presentación: 20 ml. 6,000,000 ui

UNIMAST -20

Spiramicina base 60,000.00 U.I.
Excipientes C.S.P. 100 ml.

Indicado en mastitis, metritis, pododermatitis, neumonías en bovinos, ovinos y porcinos.

Dosis: Bovinos adulto: 5 ml por cada 100 kg. de peso
Terneros, porcinos y ovinos: 5 ml. por cada 40 kg.

Administración: intramuscular, en casos agudos repetir la dosis a la 24 o 36 horas

Presentación: 25, 50, y 250 ml

MASTIZONE V.S.

Gentamicina (sulfato) 400 mg
Excipientes c.s.p 10 g

Mastizone V.S (Vaca Seca) es indicado para prevención de la mastitis durante el período seco (fuera del periodo de lactancia) y en el tratamiento de las mastitis existentes en el momento del secado.

Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única

Presentación: jeringa de 10 g

SECALAK

Espiramicina base	**1,200,000 UI**
Neomicina como sulfato	**170,000 UI**
Exipiente csp	**5 ml**

La asociación de la Espiramicina y la Neomicina produce una potente acción bactericida contra los gérmenes causantes de la mastitis, tales como: Staphylococcus aureus, Corynebacterium diphtherie, Bacilus anthracis, E coli, Enterobacter aerogenes, Proteus, Shiguella,

Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella y

Streptococcus sp.

Administración: Intramamaria

Presentación: Jeringa de 10 ml

MASTIZONE

Cefoperazona sódica 250 mg
Excipientes c.s.p 10 ml

Indicado para mastitis subclínica y clínica causadas por bacterias sensibles a la cefoperazona sódica, y con amplio espectro de acción contra microorganismos aerobios y anaerobios gram positivos y gram negativos.

Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única

Presentación: jeringa de 10 g

LACTOMAST

Espiramicina base	**200 mg**
Betametasona sódio fosfato	**4 mg**
Neomicina	**500 mg**
Exipiente csp	**10 ml**

En vacas en periodo de lactancia como antibiótico, anti-inflamatorio y para el tratamiento y control de infecciones causada por Streptococcus sp, Escherichia coli, Corynebacterium sp, Proteus sp, Klebsiella sp, y Mycoplasma sp.

Observación: ordeñar completamente, limpiar y desinfectar la ubre, aplicar una jeringa en cada cuarto, efectuar un suave masaje en la ubre para lograr la difusión del producto.

Tiempo de retiro en Leche: 120 horas, en carne no aplica

Administración: vía Intramamario

Presentación: Jeringa de 10 ml

MASTIZONE PLUS LACTACION

Gentamicina (sulfato)	**150 mg**
Bromexina (clorhidrato)	**50 mg**
Excipientes c.s.p	**10 g**

Mastizone Plus es indicado en el tratamiento de mastitis subclínicas y clínicas (agudas y crónicas).

La asociación con la bromexina permite mayor penetración y difusión del antimicrobiano hasta el local de la infección, resultando en un tratamiento más eficaz previniendo reincidencias.

Dosis: 1 jeringa por ¼ de ubre, dosis única

Presentación: jeringa de 10 g.

ANTIHELMINTICOS

BOVIPUR 25% + CO

Albendazole 25.0 g.
Cobalto 3.2 g.

Para el control de parásitos pulmonares, gastrointestinales, tenias y fasciola hepática. De acción ovicida, larvicida, sobre formas adultas y quísticas.

Dosis: 1 ml por cada 50 kg.
Para fasciola hepática duplicar la dosis, 2 ml por cada 50 kg.

Administración: oral o intrarruminal

Presentación: 20, 120, 500 ml., 1, 2 y 4 litros

FENLAK 10 %

Fenbendazol 100 mg.

Antiparasitario para el control de fases adultas, inmaduras, larvas inhibidas y huevos en bovinos, equinos, porcinos, ovinos y caninos.

Dosis: 1 ml para 44 libras. excepto en equinos.
En equinos 1 ml para 100 Libras de peso.

Tiempo de retiro en leche ***CERO DÍAS***

Administración: vía oral.

Presentación: 120, 500 ml., 1 y 2 litros

EQUIPUR

Mebendazole 20 g.
Excipientes c.s.p 100 ml

En equinos, mulares y asnales ***para el tratamiento de infestaciones parasitarias***, ocasionadas por oxyuris, strongylus vulgaris, strongylus edentatus, strongylus equinus y parascaris equorum.

Dosis: 5 ml para 220 libras de peso.

Administración: vía oral.

Presentación: jeringa de 20 ml.

LEVAMISOL AL 15%

Levamisol Hcl 15 g.

Desparasitante potente y concentrado de amplio espectro, indicado para erradicar los parásitos pulmonares y gastrointestinales.

Dosis: 1 ml por cada 66 libras de peso.
Dosis máxima en adultos 10 ml

Administración: intramuscular profundo
(No usar en equinos).

Presentación: 100, 250 y 500 ml.

PLATELMIN PLUS
THERAX PLUS

praziquantel 50mg.
promoato de pirantel 144 mg.
febantel 150 mg

Completa asociación como vermífugo para canes, combatiendo formas adultas y larvales de ascaridos, ancilostomidos, tricuridos y cestodos en canes

Dosis: vía oral, hasta 2 kg 1/4 de tableta,
de 2 a 5 kg 1/2 tableta,
de 5 a 10 kg 1 tableta,
más de 10 kg 2 tabletas

Presentación: en caja de 4 tabletas

ANTISÉPTICOS Y DESINFECTANTES

PUPPY SHAMPOO

DIVISIÓN VETERINARIA

Irgasan DP 300
Dietanolamina de ácidos grasos de coco
Lauril éter sulfato de sodio
Genapol LRO 3000
Mackamide CP
Excipientes C.S.P.

Shampoo puppy para la limpieza del pelo y control de infecciones menos en la piel, con acondicionador, en especial para lavar, limpiar, brillar, suavizar y desenredar el pelo de sus animales, dejándolos limpios, suaves, sedosos y con un brillo natural, fácil de peinar sin dejar manchas en el pelo.
Aplíquelo hasta lograr una buena espuma, deje actuar durante 5 minutos y proceda al enjuague total

De uso para canes, equinos y bovinos.

Presentación: 250 y 2000 ml

Agroservet

CALCIOS Y PREPARACIONES

Agrosenvet

GLUCONATO DE CALCIO.
Al 20%

Gluconato de calcio. (1.9 g de Calcio.) 20 g.
Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución inyectable, para tratar la hipocalcemia (fiebre de leche) raquitismo por deficiencia de calcio, osteoporosis y otros trastornos ocasionados por la deficiencia de calcio. Indicado en todas las especies.

Dosis: 110 ml. por cada 100 kg. de peso vivo.
En perros, 11 ml. por cada 10 kg. de peso vivo.

Administración: Intravenosa, intramuscular.
En equinos vía intravenosa.

Presentación: 100, 250 y 500 ml

NOVAFOS

Gluconato de calcio 90.6 g
Aidróxido de magnesio 8.5 g
Ácido hipofosforoso 20.5 g
Dextrosa anhidra 82.5 g

Para el tratamiento de enfermedades metabólicas producidas por deficiencia de calcio, magnesio, fósforo: fiebre de leche, hipofosfatemia, tetania de pastos, cetosis bobina. Coadyuvante en el tratamiento del raquitismo y osteomalacia síndrome de la vaca caída: en bovinos, equinos, porcinos y ovinos.

Dosis: Bovinos y equinos 150 ml por 220 libras; porcinos y ovinos 15 ml por 22 libras; terneros recién nacidos 10 ml intramuscular por 3 días.

Administración: intravenosa lenta o intraperitoneal.

presentación: 500 ml

HEMATURINA

Fosfato de Calcio Dibásico 7g
Calcio Gluconato 1.75g
Calcio Carbonato 0.75g
Aporta 2.52 de ion Calcio

Coadyuvante en el tratamiento de las deficiencias de calcio en todas las especies.

Dosis: 2-2.5g/100k p.v. 2 choques c/3 días

Administración: oral en el agua de la bebida.

Presentación: en sobres de 10 g.
En forma de polvo soluble.

ECTOPARASITICIDAS

FIPRO TOPSPOT

Fipronil 100 mg
Excipientes C.S.P. 1 ml

Indicado para controlar y tratar la infección por pulgas, garrapatas y piojos en perros y gatos. Ayuda al control de la dermatitis alérgica producida por picadura de pulga.

Dosis: aplicar la totalidad del producto directamente sobre la piel, separando el pelo del animal.

No bañar al animal dentro de las 48 horas anteriores y posteriores al tratamiento

Presentación: Para Gatos >1Kg 0.50 ml
Perros de 2 a 10 kg, 0.67 ml
de 10 a 20 kg, 1.34 ml
de 20 a 40 kg, 2.68 ml
de 40 a 60 kg, 4.02 ml
>60 kg, 2 x 2.68 ml

TERMINATOR

Cipermetrina técnica 15 %

Para el control de infestación de moscas y garrapatas

Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros.

Aplicar mediante baño de aspersión a razón de 4 litros por animal adulto.

Presentación: 20, 120, 500 y 1000 ml

CYPERMETRIL POUR ON

Cipermetrina 5g

Excipientes C.S.P. 100 ml.

Posee acción sobre la mosca del establo (Stomoxys calcitrans), la mosca de los cuernos (Haemotobia irritans), garrapatas, piojos y ácaros de la sarna, con efecto prolongado.
Disminuye las reinfestaciones por tórsalo o nuche (Dermatobia hominis).

Dosis:
Como mosquicida: 10 ml por animal
Como garrapaticida: 10 ml por cada 100 kg de peso

Administración: aplicar sobre el lomo del animal

Presentación: 1 litro

CYPERMETRIL
PULVERIZACION Y BAÑO

Cipermetrina 15 g
Excipientes c.s.p 100 ml

Piretroide concentrado emulsionable con acción garrapaticida y acaricida, altamente eficaz contra garrapatas, moscas, piojos y ácaros de la sarna con efecto prolongado.

Dosis: 20 ml por mochila de 20 litros

Administración: mediante baño de aspersión

Presentación: 1 litro

SUPOKILL

Clorfenvinfós (supona) 50 g
Excipientes c.s.p. 100 ml.

Formula exclusiva de la familia de los órganos fosforados, concentrado emulsionable de uso tópico para el ***control de garrapatas, ácaros de la sarna, moscas, piojos, pulgas y miasis.***

Producto único en Guatemala.

Dosis: 1 ml por litro de agua
Para el control de garrapatas: repetir 5 o 6 veces cada 25 días

Administración: aplicar mediante baños de aspersión

Presentación: 20, 100 ml y 1 litro

AMITRAZ

Amitraz 12.5 g
Exipientes c.s.p. 100 ml

Para el control de infestaciones de garrapatas (boophylus y amblyomma) y sarna en bovinos

Dosis: 33 ml por mochila de 20 litros
No usar en equinos
Se aplica mediante baño de aspersión.

Para boophylus: repetir cada 21 días
Para amblyomma: repetir cada 8 días

Presentación: 33,120, 500 ml y 1 litro.

Boophylus

Amblyomma

ENDO-ECTOPARASITICIDAS

IVERMECTAN

Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastro intestinales pulmonares, efectivo en el control de garrapatas, piojos, tórsalo y sarna.

Ayuda en el control de la mosca de los cuernos y previene la miasis en el ombligo de los terneros recién nacidos.

Puede ser usado en vacas preñadas, hasta el sexto mes de preñez

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso

Administración: vía subcutánea

Presentación: 500 y 1000 ml.

EQUIMEC 600

Ivermectina 1.87 g

Exipientes c.s.p. 100 g

Desparasitante interno de amplio espectro para equinos, mulares y asnales.

Dosis 6.42 g. para 600 kg de peso y 4.28 g para 400 kg de peso
pasta para administración oral.

Presentación: 6.42 g.

PRIMEC

Eprinomectina 0.50 g

Excipientes C.S.P. 100 ml

Solución tópica para el control de parásitos interno y externos, (incluyendo las formas inhibidas de las ostertagia), parásitos pulmonares, nuches, mosca brava, piojos chupadores y masticadores, ácaros de la sarna

Puede ser usado en los diversos estados de preñez.

CERO DÍAS DE RETIRO EN LECHE Y CARNE

Administración: Tópico sobre el lomo del animal

Presentación: 20 y 500 ml

VIMEC 1 %

Ivermectina 10 g.
Excipirntes C.S.P. 1 ml

Para el control de parásitos gastrointestinales-pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyate y acararos de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

Administración: subcutánea.

Presentación: 1, 25, 50, 100 y 250 ml

VIMEC L.A.

Ivermectina 1%

Para el control de parásitos gastrointestinales-pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyote y ácaros de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

administración: subcutánea e intramuscular.

Presentación: 500 ml.

VIMEC TOP 3.15%

Ivermectina 3.15%

Para el control de parásitos gastrointestinales-pulmonares, y parásitos externos como garrapatas, colmoyate y ácaros de la sarna.

Dosis: 1 ml por cada 110 libras de peso.

Administración: subcutáneo,
Agítese antes de usar. (usar Aguja de calibre 15 a 20 mm)

Presentación: 500 ml

HEMOPARASITICIDAS

IMICAR

Dipropionato de Imidocarb 12 g.

Para el tratamiento profiláctico y curativo de babesiosis (piroplasmosis) y anaplasmosis en bovinos.
Se recomienda el uso de Cacodil B-12 como reconstituyente de glóbulos rojos

Dosis: babesiosis 1 ml. por 220 libras
Anaplasmosis: 2.5 ml por 220 libras

Administración: vía intramuscular en la base de la espalda.

Presentación: 10, 50 y 100 ml

TRISTEZINA

Diaceturato de Diminazeno 70 mg
Pirazolona (Dipirona) 370 mg
Excipientes c.s.p 1 ml

Tristezina es indicada en los tratamientos de Babesiosis (piroplasmosis), **Tripanosomiasis (cacho hueco**) y papilomatosis.

La pirazolona combate el dolor y la fiebre.

Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso

Administración: Intramuscular profunda

Presentación: 20 ml.

OXITÓCICOS

HORMOFISINA

Oxitocina Sintética 10 U.I.
Excipientes C.S.P. 1 ml.

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la hemorragia.

Dosis:
Fines obstétricos: Vacas y yeguas 7.5 a 10 m;
cerdas, ovejas y perras de 3 a 5 ml.

Para descenso de leche: Vacas y yeguas 1-2ml, cerdas y ovejas de 0.5-1 ml., perras máximo 0.03 ml.

Administración: vía intramuscular o

subcutánea.

Presentación: 10 ml

PLACENTINA
OXITOCINA FUERTE

Oxitocina sintética 10 UI
Excipientes 1 ml

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la hemorragia.

También tiene acción sobre los alvéolos y ductos galactóforos aumentando el flujo de la leche, promoviendo el vaciamiento total de la glándula mamaria.

Dosis: depende de la especie y forma de administrar (ver inserto)

Administración: Subcutánea, intramuscular, intravenosa y epidural

Presentación: 20, 50 y 100 ml

VITAMINAS Y MINERALES

CACODIL B-12

DIVISIÓN VETERINARIA

Cacodilato sódico 3 g	**Riboflavina (B2) 400 mg**
Cianocobalamina (B12) 4 mg	**Piridoxina (B6) 500 mg**
Tiamina (B1) 1 g	**Niacina (B3) 10 g**

Tónico reconstituyente concentrado para animales en rehabilitación por problemas de anemias, stress de viaje, y como tratamiento general en ganado de engorde y en terneros. Coadyuvante en el tratamiento de anaplasmosis y piroplasmosis.

Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml.
Terneros, potros, porcinos y ovinos 5 a 8 ml.
Caninos 1 a 3 ml

Administración: Intramuscular o intravenosa.

Presentación: 10, 25, 50, 100, 250 y 500 ml

Agroservet GUATEMALA

SOROVITA COMPLEX

Vitamina B1 (Clorhidrato de Tiamina) 500 mg
Vitamina B2 (Riboflavina) 80 mg
Vitamina B3 (Nicotinamida) 1,200 mg
Vitamina B6 (Piridoxina) 125 mg
Dextrosa 60,000 mg
Cloruro de Sodio 3,000 mg

Cloruro de Potasio 200 mg
Cloruro de Calcio 120 mg
Cloruro de Magnesio 50 mg
Metionina DL 3,000 mg
Cloruro de Colina 1,500 mg
Excipientes* c.s.p 495 ml

Complejo de vitaminas y minerales importante para el correcto metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. siendo esencial en el crecimiento y nutrición. Se indica en todos los casos de caquexia, deshidratación en postoperatorio, estados tóxicos e infecciones hepatopatías, desnutrición, hemorragias, neuropatías, acetonemias, hipertrofias orgánicas, anemias, coadyuvante en el tratamiento de enfermedades infecciosa y parasitarias.

Administración: se puede aplicar vía intravenosa, subcutánea o intraperitoneal.

Se recomienda la administración de una ampolla de Phenodral

Dosis: animales de porte grande 500 ml
Animales medianos 250 ml.
animales pequeños 20 a 50 ml

Presentación: 500 ml

PHENODRAL

Metilarsinato de Sodio 300 mg
Citrato de Hierro Amoniacal 300 mg
Solución Milesimal de Adrenalina 1.5 ml
Excipientes c.s.p 15 ml

Tónico estimulante de las funciones metabólicas. Contribuye en el aumento de apetito y formación de la hemoglobina, responsable por la unión y transporte de oxígeno a los tejidos, proporcionando mejor rendimiento en los animales, utilizada también para la piroplasmosis.

Se recomienda una aplicación paralela con Cacodil B-12

Dosis: Bovinos y equinos adultos…15 ml
Bovinos y equinos jóvenes……5 ml
Caninos medianos y grandes……2 ml
Caninos pequeños……...1 ml

Administración: Intravenosa lenta

Presentación: ampolla de 15 ml.



FERREX B-12

Hierro elemental 100 mg
Cianocobalina (B12) 100 mg

Indicado para el tratamiento de anemias causadas por deficiencia de hierro en lechones de 2 a 3 días y hasta 2 meses, en terneros por deficiencia de B12.

Dosis: Lechones 1 ml a los 3 días de nacidos y terneros lactantes 3 a 5 ml.

Administración: intramuscular.

Presentación: 10, 50 y 100 ml

SELOFOS

Fosforilcomina ……100 mg
Yoduro de potasio…20 mg
Sulfato de zinc……..15 mg
Selenito de sodio….219 mg

VICAR
DIVISIÓN VETERINARIA

Estimulante de la reproducción para el tratamiento de la deficiencia de fosforo, yodo, zinc y selenio.

Coadyuvantes en el **tratamiento de trastornos reproductivos** aumentando los porcentajes de preñez y natalidad de los hatos.

Indicado en bovinos, equinos, porcinos, caprinos, ovinos y caninos

Dosis: 1 ml por cada 44 libras en varios sitios.

Administración: intramuscular subcutánea o intravenosa.

Presentación: 50, 100 y 250 ml

Agroservet
GUATEMALA

ANTIDIARREICO

CURSOTRAT

Colargol (Plata Coloidal) 0.12 g
Excipientes c.s.p 10 ml

Tratamiento de las diarreas de origen infeccioso (diarrea con sangre y diarrea negra).
La Plata Coloidal (Colargol) posee una poderosa acción bacteriostática y cuando es inyectada provoca una intensa leucocitosis aumentando la resistencia orgánica del animal contra los procesos infecciosos.

Ejerce una acción oxidativa sobre las toxinas bacterianas reduciéndolas a sustancias inocuas al organismo.

Producto único en Guatemala

Dosis: Bovinos y equinos adultos 10 ml
Bovinos y equinos jóvenes, porcinos, ovinos y caprinos adultos 5 ml
Porcinos, caprinos jóvenes y caninos adultos 2 ml

Presentación: 10 y 50 ml.

TERAPEUTICO HORMONAL

VERRUTRAT

Clorobutanol **5 g**
Excipientes c.s.p **20 ml.**

El Clorobutanol actúa en el metabolismo del virus causador de la papilomatosis (verrugas), impidiendo su crecimiento, en bovinos, ovinos, caprinos, porcinos y caninos.

El clorobutanol también tiene un alto poder antiséptico y es un anestésico local haciendo con que la aplicación del producto sea indolora.

Después de su aplicación las verrugas desaparecen en un espacio de tiempo que varia entre 15 a 60 días sin dejar cicatrices y sin el resurgimiento de las mismas.

Dosis: 1 ml por cada 20 kg de peso vivo
en verrugas grandes, repetir la dosis a los 10 días

Administración: Subcutánea o vía tópica

Presentación: 20 ml.

ANALGÉSICOS ANTI-INFLAMATORIOS

DIURIDEM

Triclorometiazida 10 mg
Betametasona 0.55 mg
Excipientes C.S.P 20 ml, 50 ml.

En bovinos para el tratamiento del edema fisiológico de la glándula mamaria y estructuras asociadas durante el postparto y en afecciones edematosas y no inflamatorias de los bovinos y equinos.

Dosis:
Bovinos 1 ml por 20 kg PV (máx.. 20 ml por aplicación), diario durante 3 días máximo.

Equinos: 1 ml por 90 kg PV, diario por 3 días máximo.

Administración: Intramuscular.

Presentación: 20 y 50 ml

FADYNE - A4

Flunixin Meglumina 50 mg.

Excipientes s.c.p 1 ml

Analgésico y antiinflamatorio asociado con desordenes musculo-esqueléticos y cólicos en los equinos.
En bovinos, equinos y porcinos para el tratamientos de inflamación, fiebre y dolor en mastitis y metritis.

Antishock y antihistamínico

Dosis: 2 ml por cada 100 libras de peso.

Administración: intravenosa o intramuscular profunda por 2 a 3 días.

Presentación: 10, 30 y 50 ml

INHIBIDOR DE CELO

ANTICION

Acetato de Medroxiprogesterona 5 g
Excipientes c.s.p 100 ml

Como inhibidor del estro (celo) en perras y gatas

Dosis: 1 ml cada 6 meses.

Administración: Subcutánea

Presentación: ampolla de 1 ml



PRODUCTOS
AVES Y CERDOS

PROMOTOR DE CRECIMIENTO

Agroservet

PIGLINE

Ractopamina HCl 20/1000 g

L-Carnitina, Harina de trigo, oxido de silicio y aceite vegetal

Para mejorar la eficiencia alimenticia e incrementar la ganancia de peso en la finalización (+75 kg peso)

Dosis: 500gr/ton de alimento (16& de alimento) preparar premezcla con 20kgs de subproducto de molinería.

Administración: oral en el alimento.

Presentación: 5 kg

SANITIZANTE INTESTINAL

PROMOMIX 40 %

Halquinol 40g

Harina de trigo, aceite vegetal, oxido de silicio.

Mejora la eficiencia alimenticia e incremente la ganancia de peso en cerdos y aves.

Dosis: 60ppm de 75 a 150 g / ton. de alimento

Administración: en alimento balanceado.

Presentación: 1 y 5 kg

ANTIPLASMATICOS

MICOMIX

Tiamulina fumarato hidrogenada 10g/1000g

Aves: Antimicoplasmacida. Contra staphyloccus, chlostridium.
Cerdos: Contra disentería porcina (serpulina) Pleuronemocia contagiosa. Haemophyllus.

Dosis:
Aves: 25*-75mg/kg p.v.
Cerdos: 5-10mg/kg p.v. lleitis 2-3mg/kg p.v.

Administración: oral en premezcla con los alimentos.

Presentación: 1, 2 y 5 kg.

ANTIBACTERIALES

Agroservet

TRISULMIX 15%

Sulfadiazina sodica 62.5mg
Trimethoprim 12.5mg

Antibiótico en aves y cerdos

Dosis: 1gr/4-4.5 L por 7 días.

Administrar en el agua de bebida.

Presentación: 1 y 5 kg.

AVEX 20 %

Enrofloxacina 200 mg

Antibiótico bactericida de amplio espectro en enfermedades respiratorias y digestivas.

Agentes gram y micoplasmas coriza, escherichia, staphylo y estreptococos y pseudomona.

Dosis: 10mg/kg o 50mg/100lts por 3 días

Administración: oral en el agua de la bebida consumida totalmente en un lapso de 3 a 5 horas.

Presentación: 20, 100 ml y 1 litro.

CIPROVIC

Ciprofloxacina Clorhidrato 20g

Contra enfermedades respiratorias causadas por micoplasmas, haemophyllus y pasteurella.y del sistema digestivo por escherichia coli.

Dosis: Aves: 10mg/kg p.v. por 3 a 5 días (100g/500L).

Presentación: 25 g.